

# Anaftin<sup>®</sup> Gel

Anaftin<sup>®</sup> Gel palīdz atvieglot sāpes, ko izraisa sījuši nelieli bojājumi mutes dobumā, piemēram, aftoza stomatīta, aftozu čūlu, kā arī ortodontisko skavu un slikti pielāgotu protēžu izraisītu nelielu bojājumu gadījumā. Tas ir indicēts arī difūzu aftozu čūlu gadījumā.

## Darbības mehānisms

Anaftin<sup>®</sup> Gel satur polivinilpirolidonu (PVP) un hialuronskābi, kas veido mutes dobumu izklājošu aizsargplēvīti, nodrošinot skarto apvidu mehānisku aizsardzību un tādējādi atvieglojot sāpes, ko izraisa atklāti nervu gali. Sastāvā esošā hialuronskābe un alveja veicina dabīgu bojāto audu dzīšanu.

## Lietošanas norādījumi

Uzklājiet 1 vai 2 pilienus gela, lai nosegtu visu mutes dobumā esošo čūlu vai bojājumu. Izvairieties no tiešas aplikatora saskares ar bojājumu. Nepieskarieties bojājumam ar mēli vismaz 2 minūtes, lai varētu izveidoties aizsargplēvīte. Pēc katras lietošanas reizes uzlieciet atpakaļ vāciņu. Lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus, neko neēdiet un nedzeriet vismaz 1 stundu pēc gela uzklāšanas.

Lietot 3 - 4 reizes dienā vai biežāk, ja nepieciešams.

## Sastāvdaļas

Ūdens, polivinilpirolidons (PVP), maltodekstrīns, propilēnglikols, PEG-40 hidroģenēta rīcinēļa, ksantāna sveķi, kālija sorbāts, nātrija benzoāts, nātrija hialuronāts, aromātviela, benzalkonija hlorīds, dinātrija EDTA, nātrija saharīns, dikālija glicirizāts, *Aloe barbadensis*.

## Uzmanību!

Katru Anaftin<sup>®</sup> Gel tūbiņu drīkst lietot tikai vienam konkrētam pacientam, lai izvairītos no aplikatora un gela krusteniskas kontaminācijas. Anaftin<sup>®</sup> Gel lietošana ir kontrindicēta pacientiem, kuriem ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. Ja esat grūtniece, pirms preparāta lietošanas konsultējieties ar ārstu. Ja Jums bieži mutes dobumā ir čūlas, ieteicams konsultēties ar ārstu.

## Piesardzības pasākumi un brīdinājumi

Nelietot pēc derīguma termiņa vai tad, ja tūbiņa izskatās bojāta vai ir konstatējama noplūde. Glabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Glabāt istabas temperatūrā, sargājot no tiešas karstuma iedarbības. Nesasaldēt.

## Tilpums

8 ml

## Ražotājs:

Alliance Pharma Srl,  
Viale Restelli 5,  
20124 Milan, Itālija



## Izplatītājs:

BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125,  
12489 Berlin, Vācija

## Pārskatīts 09/2016